

Impact of Non-Nutritive Sucking and Bottle Feeding Habits on Orofacial Development and Oral Health in Early Childhood: Literature review.

Impacto de los Hábitos de Succión No Nutritiva y Alimentación con Biberón en el Desarrollo Orofacial y la Salud Bucodental en la Primera Infancia: Revisión literaria.

Autores:

Merino-Estrella, Lessly Madeley
UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS

Estudiante
Quito – Ecuador



anapaulasojos23@gmail.com



<https://orcid.org/0009-0008-8942-5406>

Collantes-Acuña, Jenny Edith
UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS

Docente
Quito – Ecuador



Jennyc@uhemisferios.edu.ec



<https://orcid.org/0000-0001-8303-0587>

Fechas de recepción: 21-ABR-2025 aceptación: 21-MAY-2025 publicación: 30-JUN-2025



<https://orcid.org/0000-0002-8695-5005>

<http://mqrinvestigar.com/>



Resumen

Introducción: La succión no nutritiva y el uso prolongado del biberón en la primera infancia pueden alterar el desarrollo orofacial y favorecer la aparición de maloclusiones, caries dental y otras disfunciones del sistema estomatognático. Factores como la deficiente higiene oral, el consumo frecuente de azúcares fermentables y la falta de educación en salud bucal agravan estos efectos, impactando negativamente en el bienestar físico, emocional y social del niño. **Objetivo:** Analizar el impacto de los hábitos de succión no nutritiva y la alimentación con biberón en el desarrollo orofacial y la salud bucodental durante la primera infancia, mediante una revisión detallada de la literatura científica publicada entre 2020 y 2024. **Materiales y Métodos:** Se realizó una revisión sistemática bajo la guía PRISMA, consultando artículos en PubMed, Google Académico y SciELO. Se usaron palabras clave como “hábitos orales”, “succión no nutritiva”, “biberón” y “desarrollo orofacial”. Se incluyeron estudios en español e inglés que abordaran el impacto clínico en pacientes pediátricos. De 73 artículos identificados, se seleccionaron 20 que cumplieron con los criterios de inclusión. **Resultados:** La literatura analizada evidencia que tanto la succión no nutritiva como el uso prolongado del biberón pueden alterar la coordinación funcional bucal y provocar maloclusiones, especialmente en ausencia de higiene y orientación profesional oportuna. **Conclusión:** El análisis indicó que estos hábitos representan un riesgo significativo para la salud bucodental infantil, siendo necesario implementar intervenciones preventivas, educación a cuidadores y seguimiento clínico temprano para promover un desarrollo oral armónico.

Palabras clave: hábitos orales; salud bucal; biberón



Abstract

Introduction: Non-nutritive sucking and prolonged bottle feeding in early childhood can disrupt orofacial development and promote the development of malocclusions, dental caries, and other dysfunctions of the stomatognathic system. Factors such as poor oral hygiene, frequent consumption of fermentable sugars, and a lack of oral health education exacerbate these effects, negatively impacting children's physical, emotional, and social well-being. **Objective:** To analyze the impact of non-nutritive sucking habits and bottle feeding on orofacial development and oral health during early childhood through a detailed review of the scientific literature published between 2020 and 2024. **Materials and Methods:** A systematic review was conducted under the PRISMA guidelines, consulting articles in PubMed, Google Scholar, and SciELO. Keywords such as "oral habits," "non-nutritive sucking," "bottle," and "orofacial development" were used. Studies in Spanish and English that addressed the clinical impact on pediatric patients were included. Of 73 articles identified, 20 were selected that met the inclusion criteria. **Results:** The literature analyzed shows that both non-nutritive sucking and prolonged bottle use can alter oral functional coordination and cause malocclusions, especially in the absence of hygiene and timely professional guidance. **Conclusion:** The analysis indicated that these habits represent a significant risk to children's oral health, making it necessary to implement preventive interventions, caregiver education, and early clinical follow-up to promote harmonious oral development..

Keywords: oral habits; oral health; bottle feeding



Introducción

La succión no nutritiva, cuando se mantiene más allá de los primeros años de vida, puede afectar el desarrollo funcional del sistema estomatognático, interfiriendo con la deglución, respiración y masticación, lo cual incrementa el riesgo de maloclusiones como la mordida abierta o clase II (Morales et al., 2024) El uso prolongado del biberón, especialmente en combinación con una higiene oral deficiente, se asocia con una mayor incidencia de caries dental durante la infancia. (Sadoun et al., 2024) Evaluar el impacto de estos hábitos permite establecer estrategias preventivas que favorezcan un crecimiento oral armónico desde etapas tempranas. (Badrov et al., 2025)

El consumo habitual de azúcares libres desde los primeros años de vida representa un factor de riesgo crítico para el desarrollo de caries, ya que desequilibra el biofilm bucal y favorece procesos de desmineralización que comprometen la integridad del esmalte. (Agudelo et al., 2023) La caries en la infancia temprana continúa siendo un problema de salud pública de alta prevalencia, cuyas consecuencias se reflejan en el deterioro del desarrollo infantil, la disminución de la calidad de vida y la sobrecarga económica para las familias, lo que subraya la importancia del rol preventivo del pediatra y los cuidadores. (Giacosa et al., 2024) La caries en la primera infancia constituye una de las enfermedades crónicas más prevalentes y prevenibles, afectando el bienestar físico, emocional y económico de las familias, lo que demanda un rol activo de pediatras y cuidadores en estrategias educativas y preventiva. (Urman et al., 2023)

En Ecuador, la alta prevalencia del 79,4 % en niños de seis años está asociada a factores dietéticos, deficiencias nutricionales y condiciones sociales desfavorables, lo que exige intervenciones integrales que involucren educación nutricional y participación familiar. (Sojos & Collantes, 2025) Además, los hábitos orales repetitivos y no tratados desde edades tempranas pueden alterar el desarrollo orofacial, por lo que se recomienda su evaluación profesional a partir de los tres años para prevenir complicaciones futuras. (Awuapara et al., 2021) Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto de los hábitos de succión no nutritiva y la alimentación con biberón en el desarrollo orofacial y la salud bucodental durante la primera infancia, mediante una revisión detallada de la literatura científica publicada entre los años 2020 y 2024.



Material y métodos

Esta revisión de literatura se elaboró siguiendo las directrices de la guía PRISMA, con la finalidad de analizar el impacto que tienen los hábitos de succión no nutritiva y el uso del biberón en el desarrollo orofacial y la salud bucodental durante la primera infancia. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de artículos científicos publicados entre los años 2020 y 2024 en bases de datos reconocidas como PubMed, Google Académico y SciELO. La selección de información se realizó utilizando combinaciones de palabras clave como hábitos orales, succión no nutritiva, biberón y desarrollo orofacial, enfocándose en estudios que aportaran evidencia sobre las consecuencias clínicas de estos hábitos en la población pediátrica.

Se establecieron criterios de inclusión que consideraron únicamente artículos disponibles en texto completo, publicados en el periodo antes mencionado, redactados en español o inglés y con contenido clínico relevante dentro del campo de la odontopediatría. Por otro lado, se excluyeron artículos duplicados, investigaciones dirigidas exclusivamente a población adulta, estudios con un enfoque técnico sin aplicación clínica directa y aquellos que no estuvieran relacionados con la especialidad odontopediátrica. El proceso de selección se desarrolló en tres etapas sucesivas: revisión de títulos, análisis de resúmenes y evaluación del texto completo.

Inicialmente se identificaron 73 artículos, de los cuales solo 20 cumplieron con los requisitos metodológicos establecidos. Estos trabajos fueron distribuidos de la siguiente manera: 13 artículos provenientes de PubMed, 4 de Google Académico y 3 de SciELO. Para garantizar la validez y consistencia de la información seleccionada, se aplicó la clasificación de niveles de evidencia del Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, lo que permitió asegurar un enfoque riguroso en el análisis de la influencia de los hábitos orales en el desarrollo bucodental infantil.

Resultados

Succión No Nutritiva: Mecanismos y Factores Asociados

La succión no nutritiva es un reflejo primitivo que se presenta en etapas tempranas de la gestación, se activa mediante estímulos táctiles alrededor de la boca y permite al neonato



generar presión intraoral y realizar succiones rítmicas sin aporte nutricional, este patrón en ráfaga-pausa mejora con la edad gestacional y facilita la autorregulación, en bebés prematuros su desarrollo puede estar comprometido debido a inmadurez neurológica, falta de fuerza muscular o condiciones médicas, afectando la coordinación de succión, deglución y respiración, por lo que su evaluación temprana es clave para detectar posibles disfunciones del sistema nervioso central y orientar intervenciones que favorezcan la transición a una alimentación oral efectiva. (Vijay et al., 2023)

La triada funcional succión-respiración-deglución es esencial para una alimentación oral segura en el neonato, sin embargo, en recién nacidos pretérmino esta coordinación puede verse comprometida por inmadurez neurológica, bajo peso, o complicaciones respiratorias, lo que incrementa la necesidad de oxígeno y limita la capacidad de sostener una alimentación efectiva, factores como la fatiga, la intubación prolongada o la aversión oral alteran la dinámica de la succión nutritiva, siendo común la aparición de tos, ahogos y desaturación, por ello, la evaluación del patrón SDR, junto con la medición de la saturación periférica de oxígeno, se convierte en un criterio clave para establecer el momento oportuno y seguro para iniciar la alimentación oral en neonatos con dificultades respiratorias. (Leguizamo Galvis, 2021)

Alimentación con Biberón y su Influencia en el Desarrollo Orofacial

La alimentación con biberón influye significativamente en el desarrollo orofacial del lactante, ya que al no requerir el mismo esfuerzo muscular que la lactancia materna, limita la estimulación adecuada de la musculatura estomatognática, esto puede afectar la posición y crecimiento de la mandíbula, así como la función de la lengua y los músculos faciales, reduciendo el impacto positivo que la succión materna genera en el desarrollo del complejo craneofacial, además, su uso prolongado se asocia con una mayor incidencia de maloclusiones como mordida abierta o cruzada, al no favorecer una correcta relación oclusal ni la maduración funcional del sistema oral, lo que compromete el equilibrio estructural y funcional en etapas posteriores del crecimiento infantil. (Boo et al., 2024)

La alimentación con biberón durante la primera infancia influye en el desarrollo orofacial al modificar los patrones naturales de succión y deglución que se establecen intraútero y se perfeccionan con la lactancia materna, al no requerir el mismo esfuerzo muscular ni el mismo

control neuromotor que el pecho materno, el biberón limita la estimulación adecuada de las estructuras del sistema estomatognático como la lengua, la mandíbula y los músculos faciales, esto puede afectar el desarrollo sensoriomotor oral, la coordinación de la triada succión-deglución-respiración y el crecimiento armónico del complejo craneofacial, comprometiendo así funciones futuras como la masticación, el habla y la oclusión dental. (Kalhoff et al., 2024)

Alteraciones Orofaciales Asociadas a Hábitos Prolongados

Los hábitos orales prolongados como la succión del pulgar, el empuje lingual y la respiración bucal generan alteraciones orofaciales significativas durante el crecimiento infantil, ya que interfieren con el desarrollo armónico de las estructuras dentales y musculares, cuando estos hábitos persisten más allá de los tres o cuatro años comprometen el equilibrio funcional entre la lengua, los labios y los dientes, provocando maloclusiones como mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, apiñamiento o protrusión dental, además estos patrones repetitivos afectan la estética facial, la masticación y el habla, generando también repercusiones psicosociales que impactan la calidad de vida del niño, por ello es esencial una intervención temprana que permita corregir estas disfunciones antes de que se consoliden en la dentición permanente. (Katib et al., 2024)

Los hábitos orales prolongados como la succión no nutritiva, incluyendo el uso del chupón, la succión digital o el biberón, generan alteraciones en la musculatura y estructuras orofaciales del niño, al modificar la posición natural de los labios y la lengua en comparación con la lactancia materna, estas prácticas prolongadas pueden afectar el desarrollo normal de los maxilares y provocar problemas estéticos y funcionales en la salud bucal, además de contribuir a la aparición de maloclusiones, la evidencia científica destaca que la lactancia materna actúa como un estímulo ortopédico positivo que favorece el crecimiento equilibrado del sistema estomatognático y reduce el riesgo de enfermedades, lo que refuerza la necesidad de prevenir hábitos nocivos en etapas tempranas del desarrollo. (Acosta et al., 2021)

Consecuencias en la Salud Bucodental: Caries y Otras Lesiones

La salud bucodental en la infancia se ve fuertemente comprometida por una dieta rica en azúcares, especialmente cuando se combinan prácticas como el uso nocturno de biberón con

leche azucarada o miel, estas conductas favorecen la aparición de caries de la primera infancia que afectan los dientes temporales y pueden causar dolor, alteraciones del sueño y dificultades en funciones básicas como la masticación, la deglución y el habla, si no se trata a tiempo, la caries puede avanzar hasta requerir la extracción del diente, lo que genera una pérdida prematura que interfiere con el desarrollo orofacial adecuado, además de provocar consecuencias emocionales y sociales en el niño, por lo tanto, la prevención a través de hábitos alimenticios saludables y educación familiar es esencial para evitar lesiones bucales y preservar el bienestar general. (Fioravanti et al., 2022)

Las consecuencias en la salud bucodental de niños y adolescentes en centros de atención residencial se manifiestan principalmente en una alta prevalencia de caries y lesiones de la mucosa oral, producto de una higiene deficiente, una alimentación poco saludable y el acceso limitado a servicios odontológicos, la caries dental en este grupo vulnerable puede avanzar sin tratamiento, generando dolor crónico, infecciones, pérdida temprana de piezas dentarias y alteraciones en la función masticatoria, además, las lesiones bucales como úlceras o inflamaciones son más frecuentes debido al descuido en el autocuidado y a factores emocionales asociados al entorno institucional, estas condiciones no solo afectan la salud oral, sino que deterioran la calidad de vida, generando malestar físico, baja autoestima e incluso rechazo social. (Akbeyaz et al., 2025)

Prevención y Abandono de Hábitos de Succión No Nutritiva

La prevención y abandono de los hábitos de succión no nutritiva en la infancia es fundamental para evitar alteraciones en el desarrollo orofacial y la oclusión, estos hábitos como el uso prolongado de chupete o la succión digital suelen cesar espontáneamente con la maduración emocional del niño, sin embargo cuando persisten más allá de los 36 meses pueden causar consecuencias estructurales que requieren intervención odontológica, por ello es clave que profesionales de la salud y padres identifiquen estos hábitos a tiempo y promuevan estrategias de modificación conductual y orientación anticipatoria, fomentando el abandono progresivo mediante refuerzo positivo o en casos necesarios el uso de dispositivos ortodónticos, reduciendo así el riesgo de tratamientos correctivos más invasivos en etapas posteriores. (Maloney & Leith, 2023)

La prevención y abandono de los hábitos de succión no nutritiva como la succión del pulgar o el uso prolongado del chupete son fundamentales para evitar alteraciones en el desarrollo de la oclusión y estructuras orofaciales, estos hábitos cuando se mantienen más allá de los tres años pueden generar maloclusiones como mordida abierta o inclinación dental, por lo que su detección temprana y la intervención gradual con métodos conductuales como recompensas o el uso de sustancias amargas es esencial, en casos persistentes pueden requerirse dispositivos intraorales como la cuna palatina o el recordatorio electrónico, los cuales han demostrado ser eficaces y bien aceptados por los niños, siendo clave que el enfoque terapéutico sea comprensivo, no punitivo y adaptado a la edad del paciente. (Eltager et al., 2025)

Implicaciones Clínicas y Recomendaciones para la Práctica Odontopediátrica

El impacto de los hábitos de succión no nutritiva y la alimentación con biberón en la primera infancia representa un desafío clínico importante en odontopediátrica, ya que su persistencia más allá de los primeros años puede alterar el desarrollo orofacial normal generando maloclusiones, mordidas abiertas o cruzadas y disfunciones musculares, por lo tanto los profesionales deben identificar tempranamente estos hábitos y orientar a los cuidadores mediante estrategias educativas, refuerzo positivo y, en casos persistentes, intervenciones ortodónticas no invasivas, además se recomienda promover la lactancia materna como medio óptimo para estimular la musculatura oral y prevenir alteraciones funcionales, reforzando prácticas preventivas personalizadas según la edad y condiciones del niño para garantizar una salud bucodental adecuada a largo plazo. (Han et al., 2025)

Es fundamental reconocer que los hábitos de succión no nutritiva y la alimentación con biberón, especialmente cuando se prolongan más allá de los 18 a 24 meses, pueden tener efectos adversos en el desarrollo orofacial y en la salud bucodental del niño, estas prácticas están asociadas con un mayor riesgo de maloclusiones y caries dental, particularmente cuando se combinan con la alimentación nocturna sin higiene oral adecuada, por ello se recomienda a los profesionales de la salud bucal orientar a los cuidadores sobre la importancia de interrumpir estos hábitos a tiempo, promover la lactancia materna con medidas de higiene complementarias y establecer estrategias preventivas individualizadas

que favorezcan un crecimiento oral armónico y una buena calidad de vida desde la infancia. (Carrillo et al., 2021)

Discusión

En la presente revisión, se resalta la influencia de los hábitos de succión no nutritiva y la alimentación con biberón en el desarrollo orofacial infantil, y se confirma con lo señalado por Boo et al. (2024), quienes indican que el uso prolongado del biberón limita la estimulación adecuada de la musculatura estomatognática y puede alterar el patrón funcional de la mandíbula y la lengua, generando maloclusiones como mordida abierta o cruzada; este hallazgo es respaldado también por Kalhoff et al. (2024), quienes señalan que la alimentación con biberón modifica la coordinación de la triada succión-deglución-respiración, comprometiendo funciones futuras como la masticación, el habla y la oclusión dental.

Los hallazgos de Acosta et al. (2021), afirman que los hábitos prolongados como la succión digital o el uso del chupón generan alteraciones funcionales y estructurales en los maxilares, mientras que la lactancia materna favorece un desarrollo craneofacial equilibrado y saludable, actuando como estímulo ortopédico natural; de igual forma, Eltagher et al. (2025) destacan que la intervención temprana mediante dispositivos intraorales como la cuna palatina permite corregir patrones inadecuados, evitando así que se consoliden alteraciones permanentes, lo que refuerza la necesidad de un enfoque preventivo y educativo desde los primeros meses de vida.

Las limitaciones en cuanto a la evidencia disponible radican en la heterogeneidad de los estudios, ya que algunos autores como Han et al. (2025) mencionan los efectos adversos de los hábitos prolongados en la salud bucodental, pero no siempre consideran la influencia de factores como el nivel socioeconómico, la educación de los cuidadores o la frecuencia de higiene oral en casa; además, muchos trabajos presentan debilidades metodológicas o no incluyen un seguimiento a largo plazo, lo cual dificulta establecer relaciones causales firmes entre la duración de estos hábitos y el desarrollo de patologías específicas como la caries o las maloclusiones severas.

Como odontólogos, comprender la interacción entre los hábitos orales tempranos y el desarrollo estructural del sistema estomatognático permite orientar nuestras acciones clínicas



hacia la prevención, la educación familiar y la intervención oportuna, aportando así herramientas efectivas para disminuir la prevalencia de caries temprana, alteraciones oclusales y trastornos funcionales; el conocimiento compartido por Carrillo et al. (2021) refuerza la importancia de establecer rutinas de higiene oral desde la erupción del primer diente y promover la lactancia materna como pilar del desarrollo oral, integrando estas prácticas en las estrategias de atención integral en odontopediatría.

Conclusiones

El análisis indicó que la persistencia de hábitos de succión no nutritiva y el uso prolongado del biberón durante la primera infancia se asocian con un mayor riesgo de maloclusiones, alteraciones en el desarrollo orofacial y prevalencia de caries dental, especialmente en contextos con escasa educación en salud bucal y prácticas inadecuadas de higiene oral. Estos hábitos interfieren con el equilibrio funcional del sistema estomatognático, afectando funciones esenciales como la masticación y la deglución.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A., González, L., Cevallos, I., Cobeña, K., & Zevallos, V. (2021). Malformaciones dentales y su relación con la succión no nutritiva en niños. *Revista Científica Arbitrada En Investigaciones de La Salud GESTAR*, 4(7), 39–60. <https://doi.org/10.46296/gt.v4i7.0020>
- Agudelo, A., Galvis, J., & Villegas, E. (2023). Salud bucal en la primera infancia: estrategia con agentes educativas y acudientes. *Revista Cuidarte*. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.2676>
- Akbeyaz, E., Sezer, B., Atmaca, N., Hüseyinova, N., & Kargül, B. (2025). Evaluation of the effect of dental caries, oral hygiene, and treatment need on oral health-related quality of life among Turkish orphan children and adolescents. *BMC Oral Health*, 25(1), 134. <https://doi.org/10.1186/S12903-025-05492-7/FIGURES/3>
- Awuapara, S., Bendezi, L., & Vicente, N. (2021). Manejo de los hábitos orales en odontopediatría: Revisión de literatura. *REVISTA ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA*, 20(2), 74–84. <https://doi.org/10.33738/SPO.V20I2.184>
- Badrov, M., Matijević, M., & Tadin, A. (2025). Parental Knowledge of Breastfeeding and Nutrition: Influence on Oral Health and Self-Reported Early Childhood Caries in Preschool

Children in Croatia. Pediatric Reports, 17(2), 43.

<https://doi.org/10.3390/PEDIATRIC17020043>

Boo, P., Marqués Martínez, L., Borrell García, C., & García Miralles, E. (2024). Relationship between Nutrition and Development of the Jaws in Children: A Pilot Study. *Children*, 11(2), 201. <https://doi.org/10.3390/CHILDREN11020201>

Carrillo, M., Ortega, A., Ruiz, A., Romero, M., & González, M. (2021). Impact of breastfeeding and cosleeping on early childhood caries: A cross-sectional study. *Journal of Clinical Medicine*, 10(8), 1561. <https://doi.org/10.3390/JCM10081561/S1>

Eltager, T., Bardissy, A. El, & Abdelgawad, F. (2025). Cessation of thumb/finger sucking habit in children using electronic habit reminder versus palatal crib: a randomized clinical pilot study. *BMC Oral Health*, 25(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/S12903-024-05310-6/TABLES/6>

Fioravanti, M., Di Giorgio, G., Amato, R., Bossù, M., Luzzi, V., Ierardo, G., Polimeni, A., & Voza, I. (2022). Baby Food and Oral Health: Knowledge of the Existing Interaction. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 5799. <https://doi.org/10.3390/IJERPH19105799>

Giacosa, M., Souza, E., Tourn, M., Liberman, J., García, G., Fabruccini, A., & Álvarez, L. (2024). Hábitos alimentarios y caries de la primera infancia en una población uruguaya. *Archivos de Pediatría Del Uruguay*, 95(1), e204. <https://doi.org/10.31134/AP.95.1.4>

Han, S. Y., Chang, C. L., Wang, Y. L., Wang, C. S., Lee, W. J., Vo, T. T. T., Chen, Y. L., Cheng, C. Y., & Lee, I. T. (2025). A Narrative Review on Advancing Pediatric Oral Health: Comprehensive Strategies for the Prevention and Management of Dental Challenges in Children. *Children* 2025, Vol. 12, Page 286, 12(3), 286. <https://doi.org/10.3390/CHILDREN12030286>

Kalhoff, H., Kersting, M., Sinningen, K., & Lücke, T. (2024). Development of eating skills in infants and toddlers from a neuropediatric perspective. *Italian Journal of Pediatrics*, 50(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/S13052-024-01683-0/TABLES/1>

Katib, H. S., Aljashash, A. A., Albishri, A. F., Alfaifi, A. H., Alduhyaman, S. F., Alotaibi, M. M., Otayf, T. S., Bashikh, R. A., Almadani, J. A., Thabet, A. M., & Alaman, K. A. (2024).



Influence of Oral Habits on Pediatric Malocclusion: Etiology and Preventive Approaches. Cureus, 16(11), e72995. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.72995>

Leguizamo Galvis, R. P. (2021). Criterios Para Iniciar la Succión Nutritiva en Un Neonato con Dificultades Respiratorias Una Revisión Literaria. Areté, 21(1), 65–76. <https://doi.org/10.33881/1657-2513.art.21106>

Maloney, B., & Leith, R. (2023). An Update in Non-Nutritive Sucking Habit Cessation. Journal of the Irish Dental Association. <https://doi.org/10.58541/001c.84513>

Morales, J., Morales, P., & Santillan, F. (2024). Repercusiones de succión nutritiva y no nutritiva en la primera infancia. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de La Salud. Salud y Vida, 8(1), 2152–2158. <https://doi.org/10.35381/s.v.v8i1.4102>

Sadoun, C., Templier, L., Alloul, L., Rossi, C., Díaz Renovales, I., Nieto Sanchez, I., & Martín-Palomino Sahagún, P. (2024). Effects of non-nutritive sucking habits on malocclusions: a systematic review. Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 48(2), 4–18. <https://doi.org/10.22514/JOCPD.2024.029>

Sojos, A., & Collantes, J. (2025). Efectos de la alimentación en la salud bucal infantil: Revisión literaria. MQRInvestigar, 9(2), e550. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.2.2025.e550>

Urman, G., Pistochini, A., Ferri, M. L., Sarmiento, I., Grosman, A., Urman, G., Pistochini, A., Ferri, M. L., Sarmiento, I., & Grosman, A. (2023). Conocimientos y conductas de estudiantes de posgrado de Pediatría y pediatras sobre la salud bucodental infantil. Horizonte Médico (Lima), 23(3), e2392. <https://doi.org/10.24265/HORIZMED.2023.V23N3.01>

Vijay, A., Balasubramanium, R., Krishnamurthy, R., Chilwan, U., Kamath, N., & Bhat, K. (2023). Profiling non-nutritive sucking skills in full-term and preterm neonates. Egyptian Journal of Otolaryngology, 39(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/S43163-023-00550-9/TABLES/2>



Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

Financiamiento:

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

Agradecimiento:

N/A

Nota:

El artículo no es producto de una publicación anterior.